

## غربالگری شنوایی نوزادان

با توجه به اهمیت دستگاه شنوایی در یادگیری، برقراری ارتباط و رشد مهارت های شناختی از یک سو و شیوع 2 تا 4 مورد کمشنوایی/ناشنوایی در هر 1000 تولد، لذا سازمان های جهانی انجام تست غربالگری شنوایی را در نوزادان و شیرخواران به منظور تعیین و تایید کم شنوایی تا قبل از 3 ماهگی و انجام اقدامات درمانی و توانبخشی لازمه تا قبل از 6 ماهگی، اجباری دانسته اند.

غربالگری شنوایی نوزادان به معنای انجام آزمونی ساده و سریع توسط شنوایی شناس در زمان بدو تولد (تا حداکثر یک ماهگی) به منظور تایید سلامت یا بیان احتمال اختلال در دستگاه شنوایی است. در صورت رد شدن کودک در آزمون مجدد غربالگری شنوایی، کودک برای انجام آزمون های تکمیلی شنوایی باید به مراکز تجهیزى همچون کلینیک های شنوایی و تعادل شهر سمعک ارجاع گردد تا در صورت وجود کم شنوایی، نوع و میزان دقیق کاهش شنوایی تعیین گردیده و اقدامات لازم در اسرع وقت برای کودک صورت پذیرد.

از جمله اقدامات لازم می توان به ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی جهت انجام درمان های دارویی-جراحی، ارجاع به شنوایی شناس جهت بررسی لزوم استفاده از وسایل کمک شنوایی همچون سمعک، ارجاع جهت بررسی کاندیداتوری کاشت حلزون در مراکز مربوطه، آغاز برنامه های تربیت شنوایی و ... اشاره کرد.

"غربالگری شنوایی بدو تولد نوزادان را جدی بگیرید"